



Immunglobuline, Komplement, Entzündungsfaktoren, α1-Antitrypsin, Liquorrhoe, Tumormarker, Zytokine

Abnahme-Datum: Abnahme-Zeit: Arztnummer:

Arzt-Suchernr.: Tel. Station:
 10 Stück 50 Stück
 20 Stück

Rechnung an:
 Patient
 Auftraggeber
 Drittzahler

externe Referenznummer:

Patienten-Etikette oder Patienten-Angaben

Name:
 Vorname:
 Geschlecht:
 Geburtsdatum:
 Strasse:
 PLZ/Ort:

Befundkopie an:

Serum	EDTA	Urin	BAL	Markierung
CITRAT		Liquor	Punktat	

- ### Immunglobuline
- IgG Serum
 - IgG Urin
 - IgG Liquor
 - IgG-Subklassen inkl. IgG total Serum
 - IgA Serum
 - IgA Urin
 - IgM Serum
 - IgD Serum
 - IgE Serum

- ### bei IgA-Mangel
- anti-IgA

- ### Impfantwort
- Anti-Pneumokokken IgG2 (Polysaccharid-AK)

- ### Komplementsystem
- Komplementgesamtaktivität (klassischer, alternativer und MBL-Weg)
 - > Hinweis: Serum muss vor der Bestimmung geschickt werden, auf -70°C lagern
 - Komplementfaktor C3
 - Komplementfaktor C4
 - C1-Esterase-Inhibitor quantitativ
 - C1-Esterase-Inhibitor funktionell
 - > Hinweis: Bestimmung zusammen

- ### Zirkulierende Immunkomplexe
- C3d-enthaltende Immunkomplexe
 - C1q-bindende Immunkomplexe

- ### Gammopathie-Diagnostik
- Suchtest monoklonale Gammopathie: Immunfixation, IgG/A/M, freie Leichtketten λ und κ
 - Immunfixation, IgG/A/M, freie Leichtketten λ und κ mit Ratio
 - Immunfixation, IgG/A, Leichtketten λ und κ mit Ratio
 - freie Leichtketten λ und κ inkl. Ratio
 - Leichtketten: Menge im 24 h-Urin
 - Urinmenge in 24 h:

- β -2 Mikroglobulin Serum
- β -2 Mikroglobulin Urin

- ### Entzündungsfaktoren
- CRP (serum)
 - Neopterin

- ### α1-Antitrypsin
- α1-Antitrypsin (AT) quantitativ
 - α1-Antitrypsin Phänotypisierung inkl. α1-AT Menge
 - α1-AT Menge: g/l
 - > ohne Angabe erfolgt die Bestimmung bei uns

- ### Liquorrhoe
- β 2-Transferrin
 - β 2-Transferrin

- ### Tumormarker
- β -Mikroglobulin
 - Thymidinkinase
 - S100B (Melanom)

- ### Zytokine
- Interleukin-1 β Serum
 - Interleukin-6 Liquor
 - Interleukin-2 Serum
 - Interleukin-2 Liquor
 - löslich Interleukin-2 Rezeptor Serum
 - löslich Interleukin-2 Rezeptor Liquor
 - Interleukin-4 Serum
 - Interleukin-6 Liquor
 - Interleukin-6 BAL
 - Interferon- γ Serum
 - Interferon- γ Liquor
 - Interferon- γ BAL
 - TNF- α Serum
 - TNF- α Liquor
 - TNF- α BAL
 - Interleukin-8 Serum
 - Interleukin-8 Liquor
 - Interleukin-8 BAL
 - Interleukin-10 Serum
 - Interleukin-10 Liquor
 - Interleukin-12 Serum
 - Interleukin-12 Liquor

- ### Kryoglobuline
- Kryopräzipitat-Typ
 - Kryopräzipitat quantitativ
 - > spezielle Präanalytik: Serum und EDTA-Blut muss bis zur Zentrifugation strikt bei $37-39^{\circ}\text{C}$ gehalten werden; 2 Serumröhrchen und 1 EDTA-Röhrchen ganz gefüllt notwendig

Markierung

Richtig Falsch

Einsendercode Auftraggeber:

Bitte jedes Röhrchen nach Blutentnahme 5 mal sorgfältig kippen!

Labornummer:

